



Die Sandbienen (*Andrena*) bilden eine sehr grosse Gattung innerhalb der Bienen. Weltweit gehören mehr als 1.500 Arten zu der Gattung Andrenidae.

Sie kommen vor allem in den nördlichen Kontinenten vor. Sie sind solitär lebend, Pollen sammelnde und nestbauende Bienen.

## **16.07.23 Imkertreff Müllheim Abernten, Varroa-Sommerbehandlung**

### **Rückblick: Hans Frei**

Standbesuch 01.04.23: Hans F.: starke Völker / Schwärme/  
Heiri K. starke Völker, 2.Honigaufsatz

Standbesuch 13.05.23 Hansjörg: starke Völker, er zeigte uns sein selbstgebautes Honigrührwerk, wir waren alle sehr beeindruckt. Vielen Dank für die feinen Getränke unter dem riesigen, uralten Kastanienbaum.

Standbesuch 30.06.23 Sepp L. hat seinen Stand mitten in einer grossen Apfel-Plantage 4ha mit vielen Rasenmärobotern wegen der Mäuseplage. Viele Äpfel sind durch den Sturm schon abgefallen und mussten aufgelesen werden  
Walter: sehr interessantes Bienenhaus mit versch Figuren auf jedem Flugbrett. Er gibt dort auch Grundkurse. Auf einem kleinen Rundgang sahen wir ein grosses Schildkrötengehege und auch einen hohlen Baumstamm, worin Honigbienen ohne Mittelwände bauen und leben. Im Theorieraum gab es Getränke und Walter erzählte uns die Geschichte vom Werdegang seines Bienenhauses.

### **Thema heute : Hans Frei**

Hans freut sich, dass so viele Mitglieder erschienen sind ( 38 Mitglieder).

Wir haben auch Gäste: Waltis Frau

Robin Eschbacher

Kommt der Waldhonig noch? Der regnerische und kalte April und Mai ; Läuse hatten keine Chance, dann war es 5 Wochen trocken, auch ganz schlecht für die Läuse.

Im Lehrbienenstand waren die Tage vom 19.05/20.05/21.05 die beste Honigtage. 91/2 kg. Honig innerhalb 3 Tage, das hat Hans noch nie erlebt.

Je nach Standorten war es sehr unterschiedlich. Imkerkolleg/innen erzählen, dass sie gar keinen Honigraum aufgesetzt haben, im Gegenteil, die Bienen mussten gefüttert werden.

### **Varroabehandlung :**

Einige Imker/Innen haben schon alles abgeräumt und schon die erste Winterbehandlung gemacht.

Ameisensäure ist im Moment eine schlechte Wahl, da sie nur bis höchsten 30 Grad angewendet werden sollte.

- Möglichkeiten :
- 1) Teilen / Behandeln
  - 2) Brutentnahme
  - 3) Brutstopp/Bannwabenverfahren
  - 4) Ameisensäure nach Gebrauchsanweisung
  - 5) Oxalsäure nach Gebrauchsanweisung

### **Beyvarol ist nicht empfohlen, da es Rückstände im Wachs gibt!!!**

Es ist wichtig, dass wir etwas gegen Varroa tun, bevor der Winter kommt.

Wir haben uns den Film vom BGD über die Anwendung der MAQS –Streifen angesehen. **Wichtig:** das Tragen von Schutzkleidern, nur Anwenden ab 10Grad bis 30Grad. Link zum Film: <https://www.youtube.com/watch?v=cy3aXJOETqs>

### **Seuchenfälle :**

Sauerbrut im Raum Warth 4 Fälle ( 60 Tage Sperre)  
1 Fall Faulbrut und 1 Fall Sauerbrut im Raum Berg

### **Diverses : Armin**

Der Bienen-Tag war recht Erfolgreich, der Zeitungsartikel ist auch in der neusten Bienenzeitung erschienen.

Wega-Helferliste ist am zirkulieren.

Wir erhalten Vereins-Polo-Shirt's mit Logo, bitte probieren und auf der Liste bestellen.

14. August 2023, Esther Perret